



FICHA TÉCNICA

© CONFIRM 2F

EL INSECTICIDA
INTELIGENTE PARA
PROTEGER
SUS HORTALIZAS



INSECTICIDA / FLAUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: Tebufenozide: N-tert-butil-N'-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazida (Equivalente a 240 g de i.a./ L a 25 °C)	23.0
Ingredientes inertes: Agua, agente dispersante, antiespumante, conservador, agente anticongelante y compuestos relacionados	77.0
Total:	100.0

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-INAC-0101T-301-342-023



DESCRIPCIÓN

TEBUFENOZIDE

Es un Insecticida que pertenece al grupo químico de las benzoilhidrazinas.

¿POR QUÉ DEBO USARLO?

CONFIRM® 2F es un producto que le permite a usted controlar larvas de lepidópteros a través de un modo de acción que imita la hormona que rige la muda de las larvas. Gracias a esto y a sus tolerancias EPA, **CONFIRM® 2F** es el producto eficiente para proteger sus hortalizas.

CONFIRM® 2F es ideal para ser aplicado en las primeras etapas del cultivo ya que por su modo de acción y residualidad protegerá contra las infestaciones de larvas en las primeras etapas de crecimiento. **CONFIRM® 2F** es un producto ideal para rotar o substituir aplicaciones de BTs .

¿QUÉ PUEDE HACER POR MI CONFIRM® 2F?

Contundente para Larvas de Lepidópteros.

CONFIRM® 2F provoca que al poco tiempo de haber sido ingerido, las larvas dejan de alimentarse, logrando que larvas de primer y segundo estadio estén muertas en 24 horas.

No afecta insectos benéficos.

CONFIRM® 2F tiene un alto nivel de selectividad hacia insectos benéficos como depredadores, avispas parasitoides y polinizadores; por lo que su uso no tiene consecuencia alguna sobre éstos. Cuando se requiere controlar larvas sin dañar fauna benéfica la elección es **CONFIRM® 2F** el insecticida inteligente.



**”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS
AQUÍ RECOMENDADOS”**
“INSTRUCCIONES DE USO”

¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Cultivo	Plagas	Dosis mL/ha	Intervalo de seguridad
Arroz	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	250 -333	30 días
Algodón	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	333-500	30 días
Maiz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	250 – 500	30 días
Tomatillo (Tomate de cáscara)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	333-416	1 día

Tomate (Jitomate) Chile Chile Bell			
Nogal	Barrenador del ruezno <i>Cydia caryana</i>	750	7 días
Caña de azúcar	Barrenador del tallo <i>Diatraea saccharalis</i> / <i>Eoreuma loftini</i>	200 - 300	7 días.

Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Debido a que **CONFIRM® 2F®** es un insecticida que actúa principalmente por ingestión, la aplicación debe realizarse de tal manera que se asegure un cubrimiento uniforme y completo del follaje. Se debe de aplicar en un mínimo de 200 L de agua por ha en aplicaciones terrestres y en aplicaciones aéreas en un mínimo de 60 L por ha.

Para el cultivo de **caña de azúcar** realizar dos aplicaciones dirigidas al tallo, a intervalos de 7 días con un volumen de aplicación de 540 – 550 L de agua/ha. Aplicar a la mezcla un dispersante organosiliconado (VOGA) a razón de 100 ml / 200 L de agua.

El uso de un buen dispersante es necesario para obtener una buena cobertura y adherencia. Repita la aplicación con la frecuencia necesaria para mantener el control durante la estación, respetando el intervalo de seguridad

CONTRAINDICACIONES:

No hacer más de 4 aplicaciones por temporada.

No aplique cuando las condiciones del viento favorezcan la deriva del producto, ni en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD:

CONFIRM 2F no es fitotóxico en los cultivos y con dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Si se desea mezclar, se deberá hacer con productos registrados para cada uno de los cultivos de esta etiqueta. Sin embargo siempre es recomendable realizar una prueba antes de mezclar el producto y dejar reposar la premezcla durante 15 minutos. Evite mezclar **CONFIRM® 2F** con productos de fuerte reacción alcalina

MANEJO DE LA RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec

C.P. 11580 México, D.F. Tel. (55) 5279-4340

www.summitagromexico.com.mx