

## FICHA TÉCNICA



**La autoridad de los fungicidas**

### FUNGICIDA AGRÍCOLA/CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
<b>Ingrediente activo:</b> Difenoconazole (equivalente a 250 g de i.a./L).	<b>25</b>
<b>Ingredientes inertes:</b> Co-solvente, emulsificante y solvente.	<b>75</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>

**REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0375-X0126-009-025**

### DESCRIPCIÓN:

**CANCILLER®** es un fungicida para la prevención y control de las enfermedades en los cultivos aquí indicados. Se recomienda alternar las aplicaciones de **CANCILLER®** con fungicidas de diferente modo de acción para disminuir el riesgo de futuras pérdidas de sensibilidad hacia el grupo químico de triazoles.

# ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS.

## INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS ml/ha	OBSERVACIONES
Plátano (SL)	<b>Sigatoka negra</b> <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	600	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando comiencen los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 850 – 900 L/ha.
Vid (14)	<b>Cenicilla</b> <i>Uncinola necâtor</i>	450	Realizar tres aplicaciones dirigidas al follaje y a los racimos; volumen de aplicación 800-900 L de agua/ha.
Trigo (SL)	<b>Roya de la hoja</b> <i>Puccinia triticina</i>	500 - 600	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros signos de la enfermedad; volumen de aplicación 325-425 L de agua/ha.
Berenjena (SL) Chile (SL) Jitomate (SL) Tomate (SL) Pimiento morrón (SL) Papa (14)	<b>Tizón temprano</b> <i>Alternaria Solani</i>	400 - 500	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, iniciar las aplicaciones en la etapa de desarrollo de frutos; volumen de aplicación 380-480 L/ha.

( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin límite. **Tiempo de reentrada los lugares tratados:** 12 horas después de la aplicación.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Adicione agua al tanque mezclando hasta la mitad de la cantidad de agua que se desea aplicar. Agregue la cantidad de **CANCILLER®** a utilizar. Adicione la cantidad de agua restante manteniendo la mezcla en constante agitación. Se recomienda un gasto de agua de 800 a 900 L/ha, este volumen puede variar en función de la edad, tamaño del cultivo y equipo de aplicación.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Verificar la correcta calibración del equipo antes de iniciar la aplicación. Poner agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad necesaria del producto de acuerdo a la dosis recomendada en esta etiqueta, manteniendo el agitador en marcha y completar con el resto del volumen de agua. Se recomienda agregar un coadyuvante no-iónico para mejorar el cubrimiento.

## **CONTRAINDICACIONES:**

No aplicar **CANCILLER**<sup>®</sup> cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h y en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. No haga más de dos aplicaciones consecutivas. No aplique cuando el cultivo esté estresado por condiciones de sequía o mucha humedad.

## **FITOTOXICIDAD:**

**CANCILLER**<sup>®</sup> no es fitotóxico al cultivo aquí indicado, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD:**

No aplicar **CANCILLER**<sup>®</sup> con productos altamente ácidos o alcalinos en caso necesario. Las mezclas se harán con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

## **MANEJO DE RESISTENCIA:**

"Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control."

## **GARANTÍA:**

**ANASAC MEXICO S. DE R.L DE C.V.** garantiza que la composición porcentual y el contenido neto del envase corresponden a lo indicado en la etiqueta. Como el manejo, almacenamiento, dosificación y la aplicación del producto están fuera de nuestro control, la empresa no se hace responsable por daños parciales o totales que se pudieran producir a consecuencia del uso y almacenamiento de este producto.

### **DISTRIBUIDOR:**

#### **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11580. CDMX. Tel. (55) 5279-4340  
[www.summitagromexico.com](http://www.summitagromexico.com)

### **TITULAR DEL REGISTRO:**

#### **QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.**

San Borja No. 1208 Col. Narvarte, Benito Juárez  
C.P. 03020, México, CDMX. Tel. 55-75-82-47