

FICHA TÉCNICA

CONFIRM® 2F

El insecticida inteligente para proteger sus hortalizas

INSECTICIDA/FLOABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: Tebufenozide: N-tert-butil-N'-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazida (equivalente a 240 g de i.a./L a 25 °C).	23
Ingredientes inertes: Agua, agente dispersante, antiespumante, conservador, agente anticongelante y compuestos relacionados.	77
Total	100

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-INAC-0101T-301-342-023

DESCRIPCIÓN:

Tebufenozide

Es un insecticida que pertenece al grupo químico de las benzoilhidrazinas.

¿Por qué debo usarlo?

CONFIRM® 2F es un producto que le permite a usted controlar larvas de lepidópteros a través de un modo de acción que imita la hormona que rige la muda de las larvas. Gracias a esto y a sus tolerancias EPA, **CONFIRM® 2F** es el producto eficiente para proteger sus hortalizas. **CONFIRM® 2F** es ideal para ser aplicado en las primeras etapas del cultivo ya que por su modo de acción y residualidad protegerá contra las infestaciones de larvas en las primeras etapas de crecimiento. **CONFIRM® 2F** es un producto ideal para rotar o substituir aplicaciones de BTs .

¿Qué puede hacer por mí CONFIRM® 2F?

Contundente para larvas de lepidópteros

CONFIRM® 2F provoca que al poco tiempo de haber sido ingerido, las larvas dejan de alimentarse, logrando que larvas de primer y segundo estadio estén muertas en 24 horas.

No afecta insectos benéficos

CONFIRM® 2F tiene un alto nivel de selectividad hacia insectos benéficos como depredadores, avis-
pas, parasitoides y polinizadores; por lo que su uso no tiene consecuencia alguna sobre estos.

Cuando se requiere controlar larvas sin dañar fauna benéfica la elección es CONFIRM® 2F, el insectici-
da inteligente.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADOS.

INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS ml/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD
Arroz	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	250 -333	30 días
Algodón	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	333-500	30 días
Maíz	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	250 - 500	30 días
Tomatillo (tomate de cáscara)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	333-416	1 día
Tomate (jitomate) Chile Pimiento morrón			
Nogal	Barrenador del ruezno <i>Cydia caryana</i>	750	7 días
Caña de azúcar	Barrenador del tallo <i>Diatraea saccharalis / Eoreuma loftini</i>	200 - 300	7 días

Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **Tiempo de reentrada a las áreas tratadas:** 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Debido a que **CONFIRM® 2F** es un insecticida que actúa principalmente por ingestión, la aplicación debe realizarse de tal manera que se asegure un cubrimiento uniforme y completo del follaje. Se debe de aplicar en un mínimo de 200 L de agua/ha en aplicaciones terrestres y en aplicaciones aéreas en un mínimo de 60 L por ha. Para el cultivo de caña de azúcar realizar dos aplicaciones dirigidas al tallo, a intervalos de 7 días con un volumen de aplicación de 540–550 L de agua/ha. Aplicar a la mezcla un dispersante organosiliconado (VOGA) a razón de 100 ml/200 L de agua. El uso de un buen dispersante es necesario para obtener una buena cobertura y adherencia. Repita la aplicación con la frecuencia necesaria para mantener el control durante la estación, respetando el intervalo de seguridad.

CONTRAINDICACIONES:

No hacer más de 4 aplicaciones por temporada. No aplique cuando las condiciones del viento favorezcan la deriva del producto, ni en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD:

CONFIRM® 2F no es fitotóxico en los cultivos y con dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

Si se desea mezclar, se deberá hacer con productos registrados para cada uno de los cultivos de esta etiqueta. Sin embargo, siempre es recomendable realizar una prueba antes de mezclar el producto y dejar reposar la premezcla durante 15 minutos. Evite mezclar **CONFIRM® 2F** con productos de fuerte reacción alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA:

"Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control."

GARANTÍA:

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

DISTRIBUIDOR: SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec, C.P. 11580, CDMX. Tel. (55) 5279-4340

www.summitagromexico.com