

## FICHA TÉCNICA



**Control de hongos de una forma natural**

**FUNGICIDA/POLVO HUMECTABLE**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
<b>Ingredientes activos:</b> Taninos totales derivados de extracto de castaño ( <i>Castanea sativa</i> ) (equivalente a 110 g de i.a/kg).	<b>11</b>
<b>Ingredientes inertes:</b> Dispersantes, humectante y espesante.	<b>89</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>

**REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0585-X0335-002-11.0**

### **DESCRIPCIÓN:**

**¿Qué es Shizen®?**

**Shizen®** es un fungicida a base de taninos hidrolizables y condensados de origen natural, tiene una presentación en polvo humectable.

# ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS.

## INSTRUCCIONES DE USO:

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**Shizen®** es un fungicida cuyo ingrediente activo son los taninos totales derivados del extracto de castaño (*Castanea sativa*). Por ser un producto de origen natural puede aplicarse en el momento de la cosecha ya que está exento de tolerancias, razón por la que puede usarse sin necesidad de un periodo de espera. **Shizen®** se recomienda para el control de las enfermedades descritas a continuación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita Pepino Melón Calabaza Sandía Chayote Chilacayote (SL)	<b>Cenicilla</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>  <b>Mildiú</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	<b>2.0 - 3.0 kg/ha</b>	Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, iniciar cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha. Adicionar un coadyuvante poliéter trisiloxano a razón de 0,5 ml/L de mezcla.
Cebolla Ajo Poro Cebollín (SL)	<b>Mancha púrpura</b> <i>Alternaria porri</i>	<b>2.0 - 3.0 kg/ha</b>	Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, iniciar cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha. Adicionar un coadyuvante poliéter trisiloxano a razón de 0,5 ml/L de mezcla.
Berenjena Chile Tomate verde Okra Jitomate Papa Pimiento morrón (SL)	<b>Cenicilla</b> <i>Leveillula taurica</i>	<b>2.0 - 3.0 kg/ha</b>	Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha. Adicionar un coadyuvante poliéter trisiloxano a razón de 0,5 ml/L de mezcla.

( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin límite. **Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:** una vez que seque el producto.

## PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Con el equipo de protección personal indicado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" abra el empaque cuidadosamente por la parte superior y mida la cantidad de producto indicada. En un recipiente, agregue agua hasta la mitad de su capacidad y vierta lentamente la dosis recomendada agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Vacíe la mezcla en el tanque aspersor y agregue el resto de agua según el volumen de aplicación. Aplique con aspersora terrestre (de mochila o de tractor) cubriendo todo el follaje a punto de goteo.

## **CONTRAINDICACIONES:**

No aplicar cuando exista viento fuerte (más de 15 km/hr).

## **FITOTOXICIDAD:**

**Shizen**® no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD:**

No se recomienda **Shizen**® en mezcla con otros plaguicidas para su aplicación.

## **MANEJO DE RESISTENCIA:**

"Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control."

## **GARANTÍA:**

**QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.** sólo responde de la formulación correcta y el contenido neto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario debería cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, tolerancias, tiempos de espera y residuos.

### **DISTRIBUIDOR:**

#### **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11580. CDMX. Tel. (55) 5279-4340  
[www.summitagromexico.com](http://www.summitagromexico.com)

### **TITULAR DEL REGISTRO:**

#### **QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.**

Calle 18 No. 20501, Esquina Innovación.  
Col. Impulso, C.P. 31183 Chihuahua, Chih.  
México. Tel. (614) 483-9000 Fax. (614) 483-9000