

FICHA TÉCNICA

Agry-Gent[®] Plus 800 PH

El bactericida que da confianza

BACTERICIDA / POLVO HUMECTABLE

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL: | % EN PESO |
|---|--------------|
| Ingredientes activos: Gentamicina (sulfato de gentamicina equivalente a 20 g de i.a./kg). | 2.0 |
| Oxitetraciclina (clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 60 g de i.a./kg). | 6.0 |
| Ingredientes inertes: Diluyentes, humectantes, dispersantes y compuestos relacionados. | 92.0 |
| Total | 100.0 |

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-MEZC-1323-301-002-008

DESCRIPCIÓN:

¿Por qué usarlo?

Cuando se quiere evitar la aparición de bacterias o cuando se quiere curar el ataque de las mismas, cuenta con el bactericida que te da confianza y que has probado por muchos años. El único probado por generaciones, que con su doble poder previene y detiene el ataque de las bacterias.

¿Qué puede hacer por mí Agry-Gent[®] Plus 800?

Cuando se tienen problemas de bacterias que provocan manchas foliares, pudriciones y cáncer y/o marchitez en tu cultivo ya cuentas con la herramienta ideal para detener y prevenir el ataque. **Agry-Gent[®] Plus 800** es el bactericida sistémico el cual penetra a la planta a través de los estomas y se transporta por el xilema a todos los puntos de crecimiento controlando de una forma total el problema.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ÚNICOS:

Agry-Gent® Plus 800 es una mezcla de dos potentes bactericidas que se unen para controlar de una forma efectiva los principales problemas de bacterias en campo. Sus activos no presentan resistencia cruzada con otros antibióticos. Además, es estable a las altas temperaturas a diferencia de las estreptomicinas. Cuenta con excelente compatibilidad con la mayoría de los productos agrícolas por lo que se puede mezclar con los principales insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.

Agry-Gent® Plus 800 tiene un efecto residual prolongado protegiendo al cultivo por más de 6 días, dependiendo de la infestación y condiciones climáticas. Es de muy fácil dosificación, ya que con una bolsa por hectárea previene el ataque y con dos bolsas por hectárea controla las bacterias presentes en el cultivo.

Amplio espectro

Agry-Gent® Plus 800 controla un amplio espectro de bacterias como aquellas que producen pudriciones y/o marchitez de la planta, a continuación se indican los cultivos y bacterias:

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DOSIS Y CULTIVOS

El uso de **Agry-Gent® Plus 800** es recomendable para los siguientes cultivos:

Cultivos y dosis autorizados de uso.

| CULTIVO | DOSIS | PLAGAS | INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA | OBSERVACIONES |
|---------|-----------------|--|---|--|
| Agave | 4-6 g/L de agua | Pudrición del cogollo del agave <i>Erwinia sp.</i> | SL | Se recomiendan 3 aplicaciones al cogollo con un intervalo entre ellas de 7 días, inicie las aplicaciones cuando detecte las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. |
| Clavel | 1.6 - 2.4 kg/ha | Mancha bacteriana del clavel <i>Burkholderia andropogonis</i> | SL | Se recomiendan 4 aplicaciones al cogollo con un intervalo entre ellas de 7 días, inicie las aplicaciones cuando detecte las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. |

| CULTIVO | DOSIS | PLAGAS | INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|--|---|---|
| Papa | 1600 g/400 L de agua | Pierna negra <i>Erwinia atroseptica</i> Marchitez bacterial <i>Pseudomonas solanacearum E.F.Smith</i> | 28 | Realizar una aplicación al fondo del surco antes de tapar la semilla. Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. |
| Crisantemo | 1.6 - 2.4 kg/ha | Pudrición suave del crisantemo <i>Erwinia chrysanthemi pv chrysanthemi</i> | SL | Se recomiendan 4 aplicaciones al cogollo con un intervalo entre ellas de 7 días, inicie las aplicaciones cuando detecte las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. |
| Peral | 400 g/1000 L de agua | Mancha de fuego <i>Erwinia amylovora</i> | 21 | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. |
| Tabaco | 1.6-2.4 kg/ha | Marchitez bacteriana del tabaco <i>Ralstonia solanacearum</i> | SL | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de aplicación al follaje. |
| Arroz | 1.2-2.4 kg/ha | Tizón bacteriano <i>Xanthomonas oryzae</i> | SL | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de aplicación al follaje. |
| Calabacita Pepino Melón Calabaza Sandía Chayote Chilacayote | 2.5-4.0 g/L de agua | Mancha angular <i>Pseudomonas lachrymans</i> Pudrición bacteriana <i>Acidovorax avenae</i> | SL | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; el volumen de agua recomendado para la aplicación es de 700 L/ha. |
| Chile Berenjena Pimiento morrón Tomate de cáscara Jitomate Papa | 2.5-4.0 g/L de agua | Mancha bacteriana <i>Xanthomonas vesicatoria</i> | SL | Realizar 4 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Para obtener un control adecuado de la enfermedad es necesario agregar 0.5 ml de un adherente por L de agua; el volumen recomendado de agua para la aplicación es de 700 L/ha. |

RECOMENDACIONES PARA USO EN PAPA:

| MOMENTO DE APLICACIÓN | DOSIS kg/ha |
|--|-------------|
| Preventivo Tratamiento de la semilla al momento de la siembra. | 1.6 |
| Iniciación de estolones | 0.8 |
| Inicio del tubérculo | 0.8 |
| Crecimiento del tubérculo | 0.8 |
| Curativo Aplicar al primer signo de la enfermedad cada 7 días. | 1.6 |

0.8 kg = 1 bolsa/ha; 1.6 kg = 2 bolsas/ha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el envase cuidadosamente por la parte superior y mida la cantidad de producto indicado, mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue la otra mitad del agua y agite la mezcla constantemente, para aumentar la penetración del producto agregue un penetrante en la mezcla. Aplique con una aspersora terrestre de mochila o de tractor cubriendo todo el follaje a punto de goteo.

FITOTOXICIDAD:

Agry-Gent® Plus 800 no es fitotóxico para los cultivos aquí indicados y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezcle **Agry-Gent® Plus 800** con caldo bórdeles y otros productos de fuerte reacción alcalina, cuando se requiera realizar mezclas éstas sólo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE LA RESISTENCIA:

"Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control".

GARANTÍA:

QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. sólo responde de la formulación correcta y el contenido neto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables del uso y resultados del producto. En caso de exportación de los agrícolas tratados con este agroquímico, el usuario debería cerciorarse sobre las reglamentaciones vigentes en el país de destino final en cuanto a: cultivos autorizados, tolerancias, tiempos de espera y residuos.

DISTRIBUIDOR:

SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec, C.P. 11580. CDMX. Tel. (55) 5279-4340
www.summitagromexico.com

TITULAR DEL REGISTRO:

QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Calle 18 No. 20501, Esquina Innovación.
Col. Impulso, C.P 31183 Chihuahua, Chih. México.
Tel. (614) 483-9000 Fax. (614) 483 - 9000