

## FICHA TÉCNICA

# CONFIRM<sup>®</sup> 2F

El insecticida inteligente para proteger sus hortalizas

### INSECTICIDA / FLOABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
<b>Ingrediente activo:</b> Tebufenozide: N-tert-butil-N'-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazida (equivalente a 240 g de i.a./L a 25 °C).	<b>23</b>
<b>Ingredientes inertes:</b> Agua, agente dispersante, antiespumante, conservador, agente anticongelante y compuestos relacionados.	<b>77</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>

**REGISTRO COFEPRIS: RSCO-INAC-0101T-301-342-023**

## DESCRIPCIÓN:

### Tebufenozide

Es un insecticida que pertenece al grupo químico de las benzoilhidrazinas.

### ¿Por qué debo usarlo?

**CONFIRM<sup>®</sup> 2F** es un producto que le permite a usted controlar larvas de lepidópteros a través de un modo de acción que imita la hormona que rige la muda de las larvas. Gracias a esto y a sus tolerancias EPA, **CONFIRM<sup>®</sup> 2F** es el producto eficiente para proteger sus hortalizas. **CONFIRM<sup>®</sup> 2F** es ideal para ser aplicado en las primeras etapas del cultivo ya que por su modo de acción y residualidad protegerá contra las infestaciones de larvas en las primeras etapas de crecimiento. **CONFIRM<sup>®</sup> 2F** es un producto ideal para rotar o substituir aplicaciones de BTs .

¿Qué puede hacer por mí CONFIRM® 2F?

**Contundente para larvas de lepidópteros**

CONFIRM® 2F provoca que al poco tiempo de haber sido ingerido, las larvas dejan de alimentarse, logrando que larvas de primer y segundo estadio estén muertas en 24 horas.

**No afecta insectos benéficos**

CONFIRM® 2F tiene un alto nivel de selectividad hacia insectos benéficos como depredadores, avis-  
pas, parasitoides y polinizadores; por lo que su uso no tiene consecuencia alguna sobre estos.

Cuando se requiere controlar larvas sin dañar fauna benéfica la elección es CONFIRM® 2F, el insectici-  
da inteligente.

## “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADOS”

### “INSTRUCCIONES DE USO”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS ml/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD
Arroz	<b>Gusano soldado</b> <i>Spodoptera exigua</i>	250 -333	30 días
Algodón	<b>Gusano soldado</b> <i>Spodoptera exigua</i>	333-500	30 días
Maíz	<b>Gusano cogollero</b> <i>Spodoptera exigua</i>	250 - 500	30 días
Tomatillo (tomate de cáscara) Tomate (jitomate) Chile Pimiento morrón	<b>Gusano soldado</b> <i>Spodoptera exigua</i>	333-416	1 día
Nogal	<b>Barrenador del ruezno</b> <i>Cydia caryana</i>	750	7 días
Caña de azúcar	<b>Barrenador del tallo</b> <i>Diatraea saccharalis / Eoreuma loftini</i>	200 - 300	7 días

Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

## **MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

Debido a que **CONFIRM® 2F** es un insecticida que actúa principalmente por ingestión, la aplicación debe realizarse de tal manera que se asegure un cubrimiento uniforme y completo del follaje. Se debe de aplicar en un mínimo de 200 L de agua/ha en aplicaciones terrestres y en aplicaciones aéreas en un mínimo de 60 L por ha. Para el cultivo de caña de azúcar realizar dos aplicaciones dirigidas al tallo, a intervalos de 7 días con un volumen de aplicación de 540–550 L de agua/ha. Aplicar a la mezcla un dispersante organosiliconado (VOGA) a razón de 100 ml/200 L de agua. El uso de un buen dispersante es necesario para obtener una buena cobertura y adherencia. Repita la aplicación con la frecuencia necesaria para mantener el control durante la estación, respetando el intervalo de seguridad.

## **CONTRAINDICACIONES:**

No hacer más de 4 aplicaciones por temporada. No aplique cuando las condiciones del viento favorezcan la deriva del producto, ni en horas de calor intenso.

## **FITOTOXICIDAD:**

**CONFIRM® 2F** no es fitotóxico en los cultivos y con dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD:**

Si se desea mezclar, se deberá hacer con productos registrados para cada uno de los cultivos de esta etiqueta. Sin embargo, siempre es recomendable realizar una prueba antes de mezclar el producto y dejar reposar la premezcla durante 15 minutos. Evite mezclar **CONFIRM® 2F** con productos de fuerte reacción alcalina.

## **MANEJO DE RESISTENCIA:**

"Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control."

## **GARANTÍA:**

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

### **DISTRIBUIDOR: SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11580. CDMX. Tel. (55) 5279-4340  
[www.summitagromexico.com](http://www.summitagromexico.com)