



Toma el rumbo de tu cultivo.

**Azoxistrobin: 200g de i.a./L
a 20 °C**

**Tebuconazole: 125 g de
i.a./L a 20 °C**

Suspensión concentrada

Después de un largo periodo de investigación, **Summit Agro** lanza al mercado mexicano **Timonel®** el nuevo fungicida sistémico, translaminar y de amplia residualidad para proteger tu cultivo. Con **Timonel®** tomas el control de tu cultivo en la lucha contra las enfermedades.

Timonel® es una mezcla de dos ingredientes activos ampliamente probados por los técnicos y agricultores innovadores en nuestro país.

Ventajas de uso de Timonel®:

- Ingredientes activos ampliamente probados.
- Amplio espectro de acción.
- Dos modos de acción en un sólo producto.
- Largo efecto de protección (residualidad).
- Tolerancias **EPA** de los dos activos en gran número de cultivos.

A background image of a tomato plant with several green and red tomatoes hanging from the stems. The leaves are green and serrated. The image is slightly blurred, focusing on the text boxes in the foreground.

Azoxistrobin: 200 gr/L de i.a.

Fungicida sistémico del grupo de las estrobilurinas el cual trabaja de forma preventiva y erradicante. Se mueve dentro de la planta de forma acropétala llegando a todas las hojas, incluso las recientes.

Timonel® impedirá la respiración mitocondrial ya que es el modo de acción de las estrobilurinas, lo que ocasionará la detención de la síntesis de ATP dentro de la célula.

Tebuconazole: 125 gr/L de i.a.

Fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles, el cual trabaja de forma preventiva y erradicante, se mueve dentro de la hoja de una forma rápida a toda la planta. El modo de acción del triazol presente en **Timonel®** inhibirá el proceso de la biosíntesis del ergosterol impidiendo la formación de la pared celular del hongo.



El trabajo sinérgico de los dos activos de **Timonel®** te ayudará a controlar las enfermedades que pudieran llegar a presentarse en su cultivo de una forma rápida y efectiva.

Timonel® puede ser usado en cualquier etapa del cultivo, se recomienda su uso en forma preventiva o a los primeros síntomas de las enfermedades.

Calibre su equipo de aplicación para una excelente cobertura del follaje.



**La mezcla y
concentración perfecta**

Composición porcentual:

Ingredientes activos:

Azoxistrobin:
(E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pi
rimidin-4-iloxi]fenil]-
3-metoxiacrilato de metilo.
(equivalente a 200g
de i.a./L a 20 °C).

Tebuconazole:
(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dime
til-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilme
til) pentan-3-o.
(equivalente a 125 g de
i.a./L a 20 °C).

Ingredientes inertes:
Humectante/dispersante,
anticongelante,
espesante, preservante,
antiespumante y medio
dispersante.

Total

% en peso

18.83


11.77

69.40

100

**Registro COFEPRIS:
RSCO-MEZC-FUNG-1301V-X0001-064-30.6**





Cultivo	Dosis	Enfermedad	Observaciones
Vid (14)	450 - 600 ml/ha	Cenicilla (<i>Uncinula necator</i>)	Aplicar cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a primeros síntomas. Realizar cuatro aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 750-800 L agua/ha.
Calabaza, calabacita, pepino, sandía, melón, chayote. (7)	600 ml/ha	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Aplicar cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a primeros síntomas. Realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 8 días de acuerdo a la presión de la enfermedad.
Jitomate, chile, berenjena, tomate, papa, pimiento morrón. (4)	0.60 - 0.70 L/ha.	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	Iniciar las aplicaciones cuando se presenten las condiciones ambientales para el establecimiento de la enfermedad y repetir a los 6 días o cuando se presenten los primeros síntomas.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.