

FICHA TÉCNICA



Desarrolla y protege su inversión

REGULADOR DE CRECIMIENTO / LÍQUIDO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: Hymexazol (Equivalente a 360 g de i.a. / L)	30.0
Ingredientes inertes:	70.0
Total	100.0

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-209/X/2012

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ USARLO?

TACHIGAREN®30 SL es un producto multipropósito o multitarea, con el cual los agricultores obtienen más beneficios en un sólo producto en su cultivo y maximizan su inversión.

TACHIGAREN® 30 SL primero protege su cultivo contra los hongos del suelo y posteriormente desarrolla los cultivos rápidamente mejorando la calidad y el desempeño de los mismos.

¿QUÉ PUEDE HACER POR MI TACHIGAREN®30 SL ?

Fortalece el control de enfermedades del suelo. Cuando usted aplica **TACHIGAREN®30 SL** inmediatamente impide que las enfermedades ataquen su cultivo, creando una barrera que protege a los mismos de los problemas más comunes del suelo.

Rápido Crecimiento de plantas y frutos. **TACHIGAREN®30 SL** promueve rápidamente el crecimiento de los pelos absorbentes, con los cuales interactúa para poder obtener más agua y nutrientes; lo enfoca en el crecimiento y desarrollo de su cultivo. **TACHIGAREN®30 SL** hace esto al mismo tiempo que defiende a su cultivo de los problemas del suelo.

Incrementa la calidad y mejora el desempeño del cultivo. De igual forma al tener una planta más nutrida, **TACHIGAREN®30 SL** desarrolla plantas más resistentes a las condiciones adversas que los cultivos hoy en día enfrentan, heladas, sequías, exceso de lluvia, etc.

TACHIGAREN®30 SL logra que su cultivo este siempre sano y fuerte, con una nutrición balanceada para producir más y mejor.

INSTRUCCIONES DE USO

TACHIGAREN® 30 SL es un regulador de crecimiento con una elevada actividad como promotor de enraizamiento, que incrementa el poder germinativo de la semilla y adelanta la germinación, de igual forma, aumenta notablemente la masa radicular de las plantas tratadas, lo cual favorece lógicamente el desarrollo general del cultivo. El efecto que **TACHIGAREN® 30 SL** genera al inducir el crecimiento radicular se debe a que la molécula hymexazol se descompone en N-β glucósido, carbohidrato responsable del efecto del crecimiento radicular.

TACHIGAREN® 30 SL tiene un efecto directo sobre las raíces secundarias y pelos absorbentes, aumentando así la absorción de nutrientes y la actividad fisiológica en general de la planta.

TACHIGAREN® 30 SL promueve el crecimiento de las raíces, lo cual permite una mejor asimilación de nutrientes, pues las raíces llegan a una mejor profundidad y logra de este modo ser más efectivo el uso de fertilizantes en las plantas.

Cultivo	Dosis ml/L de agua	Epoca de la aplicación	Metodo de aplicación
Jitomate Chile Tabaco	1	Realizar la primera aplicación al momento del trasplante, la segunda a los 15 días, la tercera a inicio de la floración y la cuarta al inicio de la fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench o en el sistema de riego.
Cebolla Ajo Espárrago	1	Realizar 3 aplicaciones: 30, 50 y 70 días después de la siembra.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench.
Ornamentales y viveros: Rosa Azalea Begonia Clavel Crisantemo Dalia Gardenia Geranio Gerbera Gladiolo Jacinto Nochebuena Tulipán	1	Realizar la primera aplicación a los 6 días después de la poda y posterior a ello efectuar tres aplicaciones cada 15 días.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench, o en aplicación al follaje
Fresa Zarzamora Arándano Vid Mora	1	Realizar la primera aplicación 15 días después del trasplante, la segunda a inicio de la floración y la tercera al inicio de la fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench
Lechuga Espinaca Acelga Apio Betabel	1	Realizar la primera aplicación al momento del trasplante, la segunda a los 15 días, la tercera a inicio de la floración y la cuarta al inicio de la fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench o en el sistema de riego.

Cultivo	Dosis	Epoca de la aplicación	Metodo de aplicación
Avena Cebada Centeno Arroz	1	Realizar la primera aplicación 15 días después de la emergencia, la segunda a inicio de la floración y la tercera al inicio de la formación de grano.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.
Papa	1	Realizar la aplicación al fondo del surco al momento de la siembra de los tubérculos	Se recomienda realizar la aplicación al fondo del surco al momento de la siembra
Pepino Melón Calabacita Sandía	1	Realizar la primera aplicación al momento del trasplante, la segunda a los 15 días, la tercera a inicio de la floración y la cuarta al inicio de la fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench
Manzano Durazno Peral	1	Realizar la primera aplicación al inicio de la floración, la segunda a los 15 días, la tercera a inicio de fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.
Zanahoria	1	Realizar 3 aplicaciones: 30, 50 y 70 días después de la siembra	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench o en el sistema de riego.
Piña	1	Realizar la primera aplicación 15 días antes de la floración, la segunda durante la floración y la tercera 15 días después de la segunda aplicación	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.
Mango Papaya Nogal Aguacate Guayaba Carambolo	1	Realizar la primera aplicación al inicio de la floración, la segunda a los 15 días, la tercera a inicio de fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje
Algodón	1	Realizar la primera aplicación 15 días después de la emergencia, la segunda a inicio de la floración y la tercera al inicio de la formación de bellota.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.
Plátano Banano	1	Realizar la primera aplicación al inicio de la floración, la segunda a los 15 días, la tercera al desmane.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.
Maracuyá Café Litchi Limón Naranja Mandarina Lima	1	Realizar la primera aplicación al inicio de la floración, la segunda a los 15 días, la tercera a inicio de fructificación.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.
Girasol Cártamo Maíz Sorgo	1	Realizar la primera aplicación 15 días después de la emergencia, la segunda a inicio de la floración y la tercera al inicio de la formación de grano.	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje.

Cultivo	Dosis	Epoca de la aplicación	Metodo de aplicación
Coliflor Col Brócoli	1	Realizar la primera aplicación 15 días después de la emergencia o trasplante, la segunda a inicio de la floración y la tercera al inicio de la formación de cabeza.	Se recomienda realizar las aplicaciones en drench, sistema de riego o al follaje.
Caña de Azúcar	1	Realizar la aplicación al fondo del surco al momento de la siembra sobre la semilla	Se recomienda realizar la aplicación al fondo del surco al momento de la siembra
Haba Garbanzo Ejote Frijol Chícharo Alfalfa	1	Realizar la primera aplicación 15 días después de la emergencia, la segunda a inicio de la floración y la tercera al inicio de la formación de vaina	Se recomienda realizar las aplicaciones al follaje

Cultivo	Dosis / ha	Recomendaciones de uso
Agave	200 - 400 mL	Realizar tres aplicaciones en drench durante el desarrollo vegetativo; con intervalos de 60 días entre cada aplicación. Recomendaciones por tipo de plantación: <ul style="list-style-type: none"> Plantaciones nuevas de hasta 1.5 años: realizar dos aplicaciones anuales con la dosis de 200 mL/ha; la primera al inicio de la temporada de lluvias y la segunda al final, de ser necesario y si las condiciones de desarrollo de la planta lo requieren realizar una tercera aplicación a la mitad de la temporada de lluvias. Plantaciones mayores a 1.5 y hasta 3 años: utilizar la dosis de 300 mL/ha. Plantaciones mayores de 3 años: utilizar la dosis de 400 mL/ha con los mismos periodos de aplicación a las descritas para la dosis mínima. El volumen de agua a utilizar es de 80 a 140 ml de agua por planta.

Nota: Las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta cumplen con la regulación vigente y a las exigencias del mercado nacional. Para cultivos de exportación, atenerse a las regulaciones del país destino.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, abra la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada.

Aplicación en drench. Adicione agua limpia en el tanque de mezclado del sistema de riego. Agregue la cantidad de **TACHIGAREN® 30 SL** a utilizar, manteniendo la solución en constante agitación para homogeneizar.

TACHIGAREN® 30 SL es un líquido soluble que al entrar en contacto con el agua, queda finamente distribuido, por lo cual no requiere de procedimiento especial para prepararse.

Antes de aplicar el producto, revise el sistema de riego en general y asegure que el equipo de inyección funcione adecuadamente, para lograr una distribución uniforme del producto en el predio.

INCOMPATIBILIDAD

Se recomienda que **TACHIGAREN® 30 SL** sea aplicado solo en mezcla con agua. Se recomienda hacer una prueba a pequeña escala para comprobar la compatibilidad con otros productos. Cuando se realicen mezclas, éstas solo deberán hacerse con productos registrados en los cultivos aquí indicados.

GARANTÍA:

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec

C.P. 11580 Ciudad de México. Tel. (55) 5279-4340

www.summitagromexico.com